

DEFENSOR-*MAGNESIO* 10%

FOSFITO DE MAGNESIO

Porcentaje en peso	
Fósforo (expresado como PO_3^-) soluble en agua	34.0%
Magnesio (Mg) soluble en agua	10.0%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

DEFENSOR Mg es un fertilizante a base de fosfito de magnesio

DEFENSOR Mg actúa:

- Favoreciendo **el desarrollo radicular** de los cultivos.
- Mejorando la **floración-cuajado-maduración** de los cultivos.
- Previniendo **las carencias de magnesio**.
- **Potenciando el sistema natural de defensa de las plantas**, con actuación antifúngica y evita podredumbre de raíz, previene enfermedades del cuello en frutales, hortícolas etc. y la interacción del Fosfito estimula los procesos de los sistemas de defensa contra patógenos de la planta y el Magnesio por acción de la fotosíntesis vuelve más resistente a la hoja contra la Sigatoka en banano y plátano.

Además el ion Magnesio favorece la asimilación de CO_2 (Anhídrido Carbónico), la absorción de P (Fósforo) y la producción de Azúcares.

Los principales efectos de **DEFENSOR Mg** sobre los vegetales afectan al **crecimiento, desarrollo y rendimiento de cosechas**, incrementa la actividad floral rendimiento, tamaño del fruto, total de sólidos solubles y la concentración de antocianinas y, de forma muy especial afectando al sistema radicular incrementando su masa.

MÉTODOS DE APLICACIÓN: **DEFENSOR Mg** es un producto líquido completamente soluble en agua ideal para aplicaciones foliares y edáficas. Su aplicación está especialmente recomendada en todo tipo de cultivos.

Las dosis recomendadas son:

CULTIVOS	DOSIS lts/Ha	ÉPOCA
Frutales, Cítricos, Mango	1,5 – 2,5	Durante todo el ciclo
Hortalizas de Fruto	1,0 – 2,0	15 días antes de fruto y repetir c/15 días
Ornamentales	0,5	Cuando lo crea necesario
Banano	1,5 – 2,5	2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Aguacate, Palma	1,5 – 2,5	2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Cacao	0,5/200 lts	Antes y después de la floración, igual después de aparecer el fruto
Melón, Sandía	1,0 – 2,0 y 0,5/200 lts	Antes de floración, al aparecer los frutos, y mejorar el cuajado
Papa	1,0 – 2,0 y 0,5/200 lts	Antes de floración, al aparecer los frutos, y mejorar el cuajado
Tomate, Pepino, Pimiento	1,0 – 2,0 y 0,5/200 lts	Antes de floración, al aparecer los frutos, y mejorar el cuajado
Fertirrigación	2 – 3 / aplicación	De 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Arroz	0,5 – 1,0	Antes de embuchamiento (36 – 42 días) y 10 días después
Maracuyá, Pasifloras	0,5 – 1,0 /200 lts	Antes de floración, al aparecer los frutos, y cada 10 días

RECOMENDACIONES:

DEFENSOR Mg puede irritar los ojos y la piel. Manténgase lejos del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lávese abundantemente con agua y acúdase al médico. Úsele guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad y aplicar bajo asesoramiento técnico agronómico.